

## SIEKACZE

**Pomiędzy 6 a 16 miesiącem**

8 siekaczy (środkowe i boczne).  
Służą do odgryzania kęsów pokarmu.



## PIERWSZE ZĘBY TRZONOWE

**Pomiędzy 13 a 24 miesiącem**

4 « pierwsze zęby trzonowe ». Służą do miażdżenia i rozgniatacia pokarmu.



## ZĘBY TRZONOWE

**Pomiędzy 23 a 33 miesiącem**


4 « drugie zęby trzonowe ».



## KŁY

**Pomiędzy 16 a 23 miesiącem**

4 kły. Niezwykle wytrzymałe, umożliwiają oddzielanie kęsów pokarmu.



CAMILIA® Postać farmaceutyczna: roztwór doustny. Skład jakościowy i ilościowy: 1 pojemnik jednodawkowy (minims – 1ml) zawiera: substancje czynne: Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 5CH, Rheum 5CH aa 333,3 mg. Wskazanie do stosowania: bolesne ząbkowanie u niemowląt. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancje czynne. Podmiot odpowiedzialny: BOIRON SA, 2 avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francja.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

